

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE" TÉL. RENNES (99) 36-01-74

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

Sous-Régisseur de Recettes de la D. D. A. — Protection des Végétaux — C. C. P. RENNES 9404-94

280, rue de Fougères, 35000 RENNES

ABONNEMENT ANNUEL

30 F

BULLETIN N° 13

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

18 JUILLET 1974

Les pluies tombées récemment ont été favorables au développement du Mildiou. Un risque d'extension de la maladie est donc à craindre sur les cultures insuffisamment protégées.

En conséquence, effectuer un traitement, dès le 22 ou le 23 juillet, sur les variétés sensibles dont la maturité n'est pas atteinte et pour lesquelles le défanage n'est pas envisagé avant les premiers jours d'août.

Dans les parcelles dont le défanage était prévu fin juillet, il sera prudent d'avancer cette opération de quelques jours.

Il est également recommandé d'avancer la date de destruction des fanes dans les cultures présentant déjà d'assez nombreuses taches, ceci afin d'éviter des contaminations sur tubercules.

## DORYPHORE

Sur les variétés tardives, des dégâts de ce ravageur sont toujours possibles. Surveiller les cultures afin de juger de l'opportunité d'un traitement.

## CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Une nouvelle attaque est à craindre fin juillet - début août. Assurer la protection des arbres dans la période du 23 au 26 juillet en respectant bien les délais d'emploi prescrits.

Si des taches de Tavelure existent dans le verger, ajouter un fongicide contre cette affection.

## PSYLLE DU POIRIER

Demeurer attentif à l'égard de cet insecte, dont la présence est de plus en plus fréquente dans notre région.

Pour la lutte, se référer à notre bulletin du 25 juin.

## MILDIOU DE LA TOMATE DE PLEIN AIR

Les conditions climatiques sont très favorables au développement du Mildiou sur cultures de tomates de plein air.

Prévoir un traitement dès le 22 ou le 23 juillet et, par la suite, renouveler la protection en fonction des pluies et des arrosages.

Utiliser l'un des produits suivants :

- |              |             |                                       |
|--------------|-------------|---------------------------------------|
| (1) Captafol | = 1,6 kg/ha | (Difosan FLO, Orthodifolatan liquide) |
| Mancozèbe    | = 1,6 kg/ha | (Dithane M 45, Sandozèbe)             |
| Manèbe       | = 1,6 kg/ha | (nombreuses spécialités)              |
| Propinèbe    | = 2.1 kg/ha | (Antracol).                           |

### MILDIOU ET BOTRYTIS SUR ECHALOTE ET OIGNON

Les conditions climatiques étant favorables au développement de ces maladies, effectuer dès à présent un traitement associant un fongicide contre le Mildiou à un autre contre le Botrytis :

Mildiou	:	Botrytis
(1) Mancozèbe = 1,6 kg / ha	:	Thirame = 2 kg / ha
Manèbe = 1,6 kg / ha	:	Bénomyl = 300 g / ha
Propinèbe = 2,1 kg / ha	:	Carbendazim = 300 g / ha
	:	Méthylthiophanate = 700 g / ha

(1) Les doses sont exprimées en matière active.

Ajouter un mouillant et réaliser le traitement de préférence avec un pulvérisateur pneumatique (atomiseur).

### MALADIES CRYPTOGRAMIQUES DU HARICOT

Nous sommes actuellement dans une période favorable au développement de ces affections. Se reporter aux conseils de lutte donnés dans le bulletin du 6 juin.

Les Ingénieurs chargés  
des Avertissements Agricoles

G. PAITIER & G. CHARPENTIER

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription phy-  
tosanitaire "Bretagne"

J. DELOUSTAL